

حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي

- خطُوكِ البديلة في فترات منع الحمل!



حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي


- خطُوكِ البديلة في فترات منع الحمل!

هل تمزق الواقي الذكري؟ أم انزلق العازل الأنثوي من مكانه؟
أم ربما نسيت تناول حبة منع الحمل؟


مهما حصل، توفر لك الآن حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي الحماية الالزمة؛ لأنها تساعدك على تجنب حدوث حمل غير مرغوب فيه بعد ممارسة الجنس دون وقاية أو فشل إحدى وسائل منع الحمل.

كيف تعمل حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي؟

تعمل حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي على تأجيل التبويض لمدة 5 أيام. تظل الحيوانات المنوية على قيد الحياة في الجسد الأنثوي لمدة تصل إلى 5 أيام. وبفضل تأجيل التبويض، يُمْكِن التقاط الحيوانات المنوية والبويضة ومن ثم يستحيل حدوث إخصاب.



ومع ذلك، إذا كان تبويضك قد حدث بالفعل قبل ممارسة الجماع غير المحمي، فلن تعود حبة منع الحمل الطارئة ذات جدوى أو فائدة. لذلك من المهم، أن تتناول حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي في أسرع وقت ممكن بعد ممارسة الجماع غير المحمي.



معلوماتٌ مهمة حول حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي.

حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي: خطتكِ البديلة.

نقاطُ مهمة بإيجاز


تصرّفٌ بسرعة



يمكّنكِ تناول حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي ذات المادة الفعالة أسيتات الوليبرستال حتى ما يصل إلى 5 أيام (120 ساعة) من ممارسة الجماع غير المحمي.

إلا أنه: كلما سارعتِ إلىأخذ حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي، حظيت بحمايةٍ أكثرَأماناً. تناوليها لذلك في أقرب وقتٍ ممكن بعد ممارسة الجنس غير المحمي، لأنه إذا كان التبويض قد حدث بالفعل، فلن تعود حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي ذات جدوى وفعالية.

يمكن تناول الحبة في أي وقتٍ من اليوم بعض النظر عن أوقات الوجبات وفي أي موعدٍ من الدورة الشهرية.



متوفّر في الصيدليات
دون وصفة طبية

التقيؤ



إذا تقيأتِ في غضون 3 ساعاتٍ من التناول، فمن المرجح لا يكون الجسم قد امتص حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي كاملاً. لذلك تناولي حبة أخرى لمنع الحمل الطارئة في الصباح التالي في أسرع وقتٍ ممكن.

الآثار الجانبية



إكما هو الحال في جميع الأدوية الأخرى، يمكن أن تظهر آثارٌ جانبية، ولكن ليس من الضوري حدوثها. وتشمل الأعراض الشائعةُ الغثيان أو آلام البطن أو التقيؤ أو الصداع أو الشعور بالدوار. إذا حدثت آثارٌ جانبية، أو ساورتكِ شكوك، أو راودتكِ أسئلة، فاتصلِي بطبيبكِ أو اطلبِي المشورةَ من الصيدلية.

منع الحمل وممارسة الجنس



تفيد حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي في منع الحمل الطارئ ولا تُعد وسيلةً طويلةً للأجل لمنع الحمل. وإذا مارستِ الجنس بدون وقايةٍمرة أخرى بعد تناول حبة منع الحمل الطارئة الصباح التالي للحمل، فلن يمنع ذلك الحمل. وقد تضعف، بالإضافة إلى ذلك، مؤقتاً فعاليّة وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبة منع الحمل أو اللاصقات الهرمونية. واصلِي استخدام هذه الوسائل كالمعتاد رغم ذلك، وتتوخّي الوقايةَ بصورة إضافية حتى موعد الدورة الشهرية الجديدة باستخدام الواقيات.

دمُ الحيض




إنه أمرٌ طبيعيٌ أن تأتيكِ الدورةُ الشهرية بعد تناول حبة منع الحمل الطارئة ببضعة أيام لأنها تؤجل التبويض. ومع ذلك، إذا تأخرت دورتكِ الشهرية لأكثر من 7 أيام أو كانت خفيفةً أو غزيرةً بشكلٍ غير معتاد أو إذا عانيتِ من أعراضٍ مثل آلامِ في البطن أو شعور بالشد في الثدي أو التقيؤ أو الغثيان، فشّمة احتمالَ أن تكوني حاملاً. أجري في هذه الحالة اختبار حملٍ على الفور واطلبِي المشورةَ من طبيبكِ.

الرضاعة



إذا تناولتي حبةً منع الحمل الطارئة ذات المادة الفعالة أسيتات الوليبرستال (أولي وانس = UlliOnce)، فلا ترضعي طفلكَ لمدة أسبوعٍ كاملٍ بعد التناول. ضخي الحليب، على أية حال، للحفاظ على سلامةِ تكونِ الحليب في الثدي. لكن تخلصي من الحليب بعد ذلك رجاءً.

البحثُ عن صيدلية



تتوفر حبة منع الحمل الطارئة في الصباح التالي في الصيدليات دون وصفةٍ طبية!

تجدين هنا أقرب صيدلية:

www.apothekerkammer.at/apothekensuche

لمزيد من المعلومات حول حبة منع الحمل الطارئة

في الصباح التالي ذات المادة الفعالة أسيتات

الوليبرستال تجدينها في الموقع الإلكتروني

www.ullionce.at

وتقنّم معلوماتُ الاستخدام أو الطبيب أو الصيدلانيُّ معلوماتٍ حول الفعالية أو الآثار غير المرغوب بها.

200_ULI_0723